

FICHA DE INFORMAÇÕES E DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

PerioPlak[®]
GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A
0,12%



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto:

PERIOPLAK
SOLUÇÃO ANTISSEPTICA BUCAL

Processo n.º 25351.357358/2014-31

Apresentações do produto:

| Volumes: | Código EAN: |
|-------------|-----------------|
| 250ml | 7898920384 02 6 |
| 500ml | 7898920384 06 4 |
| 1,1L | 7898920384 01 9 |
| Kit c/ 1,1L | 7898920384 05 7 |

PRINCÍPIO ATIVO:

Solução com Gluconato de Clorhexidina 0,12%.

AÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO:

- Antisséptico com eficácia superior a maioria dos agentes antibacterianos.
- Antisséptico de ação prolongada, agente antimicrobiano de amplo espectro.

*'A característica fundamental da eficácia da clorhexidina é sua substantividade, podendo ficar na cavidade bucal por até 12 horas' **

* SINNES, E.P. Et al. Controle Químico da Placa Bacteriana. In: Prevenção Clínica Odontológica. São Paulo, Artes Médicas, 1997.

PERIOPLAK

- Reduz significativamente o número de microrganismos na saliva após o uso, por seu princípio ativo ter uma ação prolongada e maior atividade antimicrobiana, auxilia na prevenção da placa bacteriana.
- Perfeito equilíbrio em sua formulação, com agradável sabor de menta, facilitando a adesão ao uso do produto.
- Previne o mau hálito e proporciona uma higiene bucal mais completa.

COMPOSIÇÃO

Chlorhexidine Digluconate, Polysorbate 20, Sorbitol, Sodium Saccharin, Menthol, Alcohol, Methylparaben, Propylparaben, CI 42090, CI 19140, Aqua, Aroma.

INDICAÇÃO

É indicado como antisséptico bucal, ajudando no combate a formação da placa bacteriana dental, da gengivite e mau hálito. Podendo fazer parte de um programa controlado pelo Cirurgião Dentista.

MODO DE USAR

Bochechar 15ml de PERIOPLAK sem diluir, pela manhã e a noite, após a higiene bucal ou conforme indicação do Cirurgião Dentista.

PRECAUÇÕES

Podem ocorrer manchas nos dentes ou nas restaurações após o uso contínuo e prolongado do produto. As manchas são externas ao esmalte dental, não afetam a saúde, podendo ser removidas com facilidade pelo dentista. Pode ocorrer diminuição do paladar, que se recupera rapidamente após a interrupção do uso do produto. Não ingerir o produto. Manter fora do alcance das crianças.

RESTRIÇÕES DE USO

Não deve ser indicado a pessoas com hipersensibilidade ou reações alérgicas a Clorhexidina.

FABRICADO POR

REYMER DO BRASIL - Indústria e Comércio Prod. Quim. Ltda.
Rua São Francisco QD 02 Lt 20 CEP.: 74980-110
Aparecida de Goiânia CNPJ: 00.075.112/0001-01
Tel 62 3094 3850 sac@reymer.com.br www.reymer.com.br
Responsável Técnico: Silviane Borges Camargo - CRF-GO 2035
A.F.E. N.º 2.03489-7.

REYMER[®]
Prevenção e Higiene em 1º Lugar.